

Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel

● ● INSEKTS- OCH SPINNMEDEL I PRYDNADSVÄXTER

Insekt och spinnmedel, preparat	<i>Aphidius ervi</i>			<i>Aphidoletes aphidimyza</i>			<i>Cryptolaemus</i>		<i>Encarsia formosa</i>			<i>Hypoaspis miles</i>			Nematod (<i>Steinernema</i>)	
	puppa	vuxen	persistens*	larv	vuxen	persistens*	larv	persistens*	puppa	vuxen	persistens*	ägg	nymf/ vuxen	persistens*	larv	persistens*
Admiral	-	1	0	1	1	-	3	0,5	3-4	1	-	1	1	0	-	-
Calypso	-	3	-	4	3	-	-	-	3	-	1-2	-	3	0	-	-
Confidor/Warrant (sprutning)	4	4	-	4	4	-	4	>4	3-4	4	>12	1	4	0	1	-
Confidor/Warrant (vattning)	1	1	0	1	1	0	3	0	1	1	>12 ^a	1	4	-	1	-
Conserve	3	3	-	1	1	-	1	-	2	3-4	1-2	-	1	-	-	-
Danitron	-	3-4	3	-	-	-	2	0	1	1	0	-	-	-	-	-
Floramite	3	1	-	1-4	-	-	1	-	1	1	0	-	1	-	-	-
Karate	4	4	8-12	4	4	8-12	4	>8	4	4	8-12	1	2-4	-	1	0
Milbeknock	1	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Mospilan	-	3-4	>2	4	3	-	4	-	3	4	2-12	-	4	1	-	-
Nissorun	1	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	-	1	1	1	0
Pirimor	1	1	0	1	4	1	1	0-1	1	2-3	0,5	1	1	0	-	-
Plenum (sprutning)	1	2-3	0	3	2	-	2	-	1	1-2	0	-	2	-	-	-
Raptol**/Pyretrum NA	1	4	0	4	4	1-2	4	2	2	-	2	2	2	1	2	-
Sumi-Alpha	4	4	8-12	4	4	8-12	4	>8	4	4	8-12	1	2-4	0-4	1	0
TEPPEKI	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	0	-	1	-	-	-
Turex och Vectobac	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	-	-	-	1	0
Vertimec	1	4	1	4	4	1	1	1	1	4	3	1	2	1	1 ^b	1

* Med persistens menas effektiviteten i veckor

** Raptol har troligtvis kortare persistens

a = avskräckande under ca 2 månader

b = 4 (skadlig, se nedan under Effekt) om nematoderna spridits på bladen

Effekt: 1 = oskadligt, 0-25 % minskad effekt av nyttodjur

2 = svagt skadlig, 25-50 % minskad effekt av nyttodjur

3 = tämligen skadlig, 50-75 % minskad effekt av nyttodjur

4 = skadlig, 75-100 % minskad effekt av nyttodjur

- = effekten är okänd

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be.

Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.

Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel

● ● INSEKTS- OCH KVALSTERMEDEL I PRYDNADSVÄXTER forts.

Insekt och spinnmedel, preparat	<i>Neoseiulus cucumeris</i> (<i>Amblyseius cucumeris</i>)			<i>Orius majusculus</i>			<i>Paecilomyces</i> <i>fumosorossus</i>		<i>Phytoseiulus persimilis</i>			<i>Typhlodromips swirskii</i> (<i>Amblyseius swirskii</i>)		
	ägg	nymf/vuxen	persistens*	nymf	vuxen	persistens*	spor	persistens*	ägg	nymf/vuxen	persistens*	ägg	nymf/vuxen	persistens*
Admiral	-	1	0	1	1	0	1	-	-	1-2	0	-	2	-
Calypso	-	1	0	4	4	2	-	-	3	3	0	-	1	0
Confidor/Warrant (sprutning)	1	4	2	4	4	-	-	-	-	3-4	2-4	3	2-3	-
Confidor/Warrant (vattning)	1	1	0	2-4	2-4	1-6	-	-	-	2	2	-	1	0
Conserve	-	1-4	1-2	4	3	0,5	-	-	-	1-2	1	4	2-4	1-2
Danitron	-	4	-	2	1	0	-	-	-	3-4	2-4	-	-	-
Floramite	-	1	0	1	1	-	-	-	-	2-3	1	1	1-3	0
Karate	4	4	8-12	4	4	8-12	-	-	4	4	8-12	-	-	-
Milbeknock	-	4	-	2	1	-	-	-	-	4	-	2	4	-
Mospilan	-	3	1	-	4	2-7	-	-	-	3-4	1-3	-	4	1-3
Nissorun	1	1	0	1-2	1-2	0	1	-	1	1	0	-	-	-
Pirimor	1	3	0	1	1	1	1	-	2	2	0,5	-	1	0
Plenum sprutning	1	1	0	2	2	1	-	-	1	2	0	1	1	0
Raptol**/Pyretrum NA	-	4	1	4	4	1	-	-	4	4	1	-	-	-
Sumi-Alpha	4	4	8-12	4	4	8-12	-	-	4	4	8-12	-	-	-
TEPPEKI	-	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0	-	1	-
Turex och Vectobac	1	1	0	1	1	0	-	-	1	1	0	-	1	0
Vertimec	-	2-4	1-2	4	4	1-6	1	-	-	4	2	4	4	1-2

* Med persistens menas effektiviteten i veckor

** Raptol har troligtvis kortare persistens

Effekt: 1 = oskadligt, 0-25 % minskad effekt av nyttodjur

2 = svagt skadlig, 25-50 % minskad effekt av nyttodjur

3 = tämligen skadlig, 50-75 % minskad effekt av nyttodjur

4 = skadlig, 75-100 % minskad effekt av nyttodjur

- = effekten är okänd

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.

Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel

● SVAMPMEDEL I PRYDNADSVÄXTER

Svampmedel, preparat	<i>Aphidius ervi</i>			<i>Aphidoletes aphidimyza</i>			<i>Cryptolaemus</i>		<i>Encarsia formosa</i>			<i>Hypoaspis miles</i>			Nematod (<i>Steinernema</i>)	
	puppa	vuxen	persistens*	larv	vuxen	persistens*	larv	persistens*	puppa	vuxen	persistens*	ägg	nymf/ vuxen	persistens*	larv	persistens*
Aliette	-	-	-	3	-	-	1	0	-	1	-	1	1	0	1	0
Amistar	1	1	-	1	1	0	-	-	1-2	1-2	0	-	1	-	-	-
Candit	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kumulus	1-2	2	0	2	1	-	1	-	1	4	4	1	1	0	3-4	0,5
Proplant och Previcur	1	1	-	-	-	-	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Scala	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	0	-	-
Signum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilt	1	1	0	1	4	0	2	-	1	1	0	1	1-2	0	1	0
Topas	1	1	0	-	-	-	1-2	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Topsin	1	1	0	1	-	0	1	0	1	1-4	0,5	1	1	0	1-2	-

* Med persistens menas effektiviteten i veckor

Effekt: 1 = oskadligt, 0–25 % minskad effekt av nyttodjur

2 = svagt skadlig, 25–50 % minskad effekt av nyttodjur

3 = tämligen skadlig, 50–75 % minskad effekt av nyttodjur

4 = skadlig, 75–100 % minskad effekt av nyttodjur

- = effekten är okänd

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.

Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel

● SVAMPMEDEL I PRYDNADSVÄXTER forts.

Svampmedel, preparat	<i>Neoseiulus cucumeris</i> (<i>Amblyseius cucumeris</i>)			<i>Orius majusculus</i>			<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>		<i>Phyto-seiulus persimilis</i>			<i>Typhlodromips swirskii</i> (<i>Amblyseius swirskii</i>)		
	ägg	nymf/ vuxen	persistens*	nymf	vuxen	persistens*	spor	persistens*	ägg	nymf/vuxen	persistens*	ägg	nymf/ vuxen	persistens*
Aliette	-	-	-	1	1	-	4	1	1	1-2	0	-	3	-
Amistar	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	0	1	1	0
Candit	1	1	0	1	1	-	-	-	1	1	0	-	2	-
Kumulus	-	2	-	2	1	-	4	-	1	1-3	0	-	2-3	-
Proplant och Previcur	-	1	0	1	1	-	-	-	1	1	0	-	1	-
Scala	-	1	0	-	1	0	3	2	1	1	0	-	3	-
Signum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilt	-	1	-	-	1	0	4	-	-	1	0	-	-	-
Topas	-	-	-	1	1	0	4	1	1	1	0	-	-	-
Topsin	2	3	2-3	-	-	-	3	-	2	3-4	2-3	-	1	0

* Med persistens menas effektiviteten i veckor

Effekt: 1 = oskadligt, 0–25 % minskad effekt av nyttodjur

2 = svagt skadlig, 25–50 % minskad effekt av nyttodjur

3 = tämligen skadlig, 50–75 % minskad effekt av nyttodjur

4 = skadlig, 75–100 % minskad effekt av nyttodjur

- = effekten är okänd

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.